

تحلیل نقش سیمای توپوگرافی در کاربری اراضی شهرستان گلوگاه با استفاده از RS و GIS

مترجم عکس‌گری: دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه سبزوار، ایران*
محمدعلی زنگنه‌اسدی: استادیار ژئومورفولوژی، دانشگاه سبزوار، ایران
زهرا رسالتی: دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه سبزوار، ایران

چکیده

استفاده از زمین بدون توجه به سیمای توپوگرافی منطقه، باعث پیامدهای ناگواری، مانند: فرسایش، بیابان زایی و تخریب منابع محیطی می‌شود. این مطالعه که در منطقه گلوگاه در شرق استان مازندران صورت گرفته است، در صدد تبیین نقش عامل توپوگرافی در کاربری اراضی، در بخشی از شهرستان به وسعت ۱۹۶۰۳ هکتار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر سنجش از دور است. در این تحقیق، به منظور طبقه‌بندی تصویر ماهواره‌ای برای تهیه نقشه کاربری اراضی، از روش حداکثر احتمال (Maximum likelihood)، به دلیل دقیق‌تر این روش در منطقه، استفاده شده است. پراکنش و وسعت کاربری‌های مختلف، شامل: اینیه انسانی، اراضی کشاورزی، باغ‌ها، مراعع، جنگل‌های انبوه و تنک، منابع آب دائمی، زمین‌های شنی و سنگلاخی با استفاده از نرم افزار Arcview تعیین و تقسیم و نقشه سیستم‌های ارضی بر مبنای نقشه‌های کاربری اراضی، شب و هیوسومتری تهیه شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در منطقه مورد بررسی، کاربری کشاورزی و جنگل‌انبوه به طور تقریباً "یکسان" بیش از ۹۵ درصد از وسعت منطقه را در برگرفته و سایر کاربری‌های انسانی ۳/۷ درصد از مساحت ناحیه را به خود اختصاص داده که قریب ۹۰ درصد آن در ارتفاع کمتر از ۲۰۰ متر جلگه‌ای هموار استقرار یافته است. به این ترتیب، سه کاربری عمده متناسب با توپوگرافی منطقه استقرار یافته‌اند.

واژه‌های کلیدی: کاربری اراضی، سیمای توپوگرافی، شهرستان گلوگاه، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) سنجش از دور (RS).

الگوهای کاربری زمین از نوع مسکونی و غیر مسکونی و ساختار فضایی حاصل از مکانیسم رفتاری میان آنها، اساس پیدایش بسیاری از مخاطرات محیطی در یک منطقه محسوب می‌شود و محیط را از توسعه پایدار دور می‌سازد.

مقدمه
تنوع در شرایط محیطی و تفاوت آن از منطقه‌ای به منطقه دیگر، باعث تفاوت در توان اکولوژیک مناطق می‌شود. کاربری زمین و سیمای توپوگرافی دو جزء جدانشدنی از سیستم عمومی ساختار محیطی است.

تهیه نقشه کاربری اراضی و پوشش زمین منطقه کردها در اسپانیا هم یکی از این موارد است که توسط مؤسسه ملی جغرافیایی این کشور انجام می‌گیرد. حداقل احتمال برای طبقه‌بندی تصاویر به کار برده، تصاویر آخذ شده مربوط به نهم جولای ۱۹۸۵ برای منطقه‌ای به وسعت ۳۷۷۵ کیلومتر مربع انتخاب شده است. به منظور بررسی دقیق نقشه، تعدادی مناطق آزمایشی با استفاده از نمونه برداری سیستماتیک، لایه‌های مرتب شده غیرهمگن انتخاب گردیدند. طبقه‌ای که بیشترین اشتباه را کسب کرده، جنگل مختلط بوده است و بعضی دیگر از مناطق جنگلی و شهری، همچنین دارای نسبت سردرگمی بالایی بوده اند (مسعودی، ۱۳۷۷: ۲۴).

در کشور نیجریه نقشه‌های پوشش زمینی و کاربری اراضی در منطقه آرگونکو بر اساس داده‌های ماهواره‌ای سنجنده MSS در سال ۱۹۸۶ – ۱۹۸۴ و عکس‌های هوایی ۱۹۷۷ گرفته شده، تهیه گردیده است. هدف از این مطالعه، تهیه نقشه از مناطق کشاورزی بوده، نقشه‌های حاصل از تفسیر چشمی عکس‌های سیاه و سفید با نقشه‌های دریافت شده از تفسیر رقومی ماهواره‌ای مقایسه گردید و کلاس‌های کاربری‌ها در هر کدام مشخص شدند. همچنین از اطلاعات حاصل از دو نوع تفسیر به عنوان مکمل و لازم برای تفسیر موفقیت‌آمیز کاربری و پوشش اراضی استفاده شد (دنگری، ۱۳۷۶، ص ۲۵).

اکثر دامنه‌ها از استحکام و پیوستگی کافی برخوردار نیستند و مواد دامنه‌ای بر اثر فعالیت دینامیکی فرآیند هوازدگی، نیروی ثقل و شبیه دامنه تحت تأثیر قرار گرفته، به سمت پایین حرکت می‌کنند و این فرآیندها گاهی با یک نوع کاربری و عملکرد انسان کنترل و گاه نیز تشدید می‌شوند. در مناطقی که شهرها و آبادی‌ها در پایکوه‌ها (همانند بخش جنوبی شهرستان گلوگاه) واقع شده‌اند، توجه به خصوصیات فیزیوگرافی منطقه بسیار مهم و حیاتی است و می‌تواند به مدیریت صحیح و اجرای روش‌های درست بهره برداری از منطقه بینجامد.

تهیه نقشه‌های کاربری اراضی و پوشش اراضی از داده‌های سنجش از دور از زمان تهیه عکس‌های هوایی شروع شد و به تدریج با اخذ تصاویر فضایی و ماهواره‌ای ابعاد گستردگی‌ای بیدا کرد که در این مورد مطالعاتی در کشورهای خارجی و چندین مطالعه در سال‌های اخیر در ایران انجام گرفته است.

در سال ۱۹۶۵، آوری (Avery) از عکس‌های هوایی سازمان کشاورزی ایالات متحده با مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۶۰ برای محاسبه تغییرات کاربری اراضی در کلارک کاونتی و جورجیا استفاده نمود. در این مطالعه، نقشه کاربری اراضی برای هر دوره و مساحت هر کاربری به کمک یک شبکه نقطه‌ای (۱۶ نقطه در اینچ مربع) که هر نقطه شامل ۴ آکر در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ بود، استفاده نمود (یوسف زاده چورسی، ۱۳۸۰: ۹).

۱۶۵۰ متری تا ساحل دریای خزر با ارتفاع ۲۶/۵ متر، و از طول جغرافیایی ۴۳°۵۲' تا ۵۳°۵۳' شرقی و عرض جغرافیایی ۳۷°۳۶' تا ۴۷°۳۶' شمالی مبادرت نموده است (شکل ۱).

این شهرستان در سال ۱۳۸۵، دارای یک مرکز شهری ۲ بخش و ۴ دهستان و ۲۶ آبادی دارای سکنه بوده است.

مواد و روش ها


ابزار و اطلاعات مورد استفاده در تحقیق حاضر، شامل: نرم افزارها، داده های سنجش از دور، نقشه ها و تصاویر مربوط به منطقه بوده که در زیر به آن ها اشاره شده است:

- نرم افزارهای ARC VIEW 3. 2, ERDAS, PCI V. 8. 1
- تصویر ماهواره ای لندست ETM مربوط به منطقه؛
- نقاط کنترل زمینی از منطقه با استفاده از دستگاه GPS که به صورت دستی برداشت شده؛
- نقشه های کاربری اداره جهاد کشاورزی استان مازندران جهت کنترل نقشه ها؛
- نقشه های توپوگرافی رقومی شده ۱:۲۵۰۰۰ سازمان نقشه برداری کشور؛
- نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ۱ بهشهر.

بررسی تغییرات سیمای طبیعی و کاربری اراضی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از GIS و عکس های هوایی در شهرستان نور استان مازندران، نشان داد که سیمای سواحل در منطقه مورد مطالعه طی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ تغییر زیادی نموده و این تغییرات هم از طریق عامل طبیعی (پیشروی آب دریا) و هم از طریق عامل انسانی بوده است. در این میان، دخالت انسانی بیشترین نقش را داشته است (ملک و شتایی جویباری، ۱۳۸۴: ۸۵-۱۰۵).

همچنین مهندسان مشاور پویاب در چهارچوب مطالعات طرح سد گلوگاه و شبکه آبیاری و زهکشی مربوط، مطالعاتی درباره منطقه در سال ۱۳۸۴ انجام داده اند. این مطالعات نشان داد که با وجود استفاده بهنگام از آب رودخانه فصلی گلوگاه و علاوه بر آن آب سه چشمی به نام های اوان، مشی و دنبی که برای مصارف زراعی بهره برداری می شود و هر یک بخشی از دشت گلوگاه را آبیاری می نماید، تکافوی توسعه کشاورزی این دشت را ننموده، نیاز به بهره برداری از آب رودخانه گلوگاه با ایجاد تأسیسات آبی متناسب کاملاً "احساس می شود.

معرفی منطقه مورد مطالعه
این تحقیق به بررسی دو شیت طولی از نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ شهرستان گلوگاه، از ارتفاع



شکل ۱: موقعیت نسبی شهرستان گلوگاه در استان و ایران

- ورود داده ها: پس از تهیه تصاویر و نقشه های لازم برای منطبق کردن تصاویر ماهواره ای با نقشه های توپوگرافی در نرم افزارهای GIS، باید این نقشه ها را با سیستم WGS84, UTM Datum زمین مرجع نمود؛

- تطبیق تصاویر ماهواره ای با نقشه های توپوگرافی: با توجه به اینکه datum، نقشه های

روش و فرآیند تحلیل منطقه ای در این پژوهش بر مبنای سیستم های ارضی استوار است که این تحلیل یک طبقه بنده علمی بر مبنای شکل اراضی و با ساختاری سلسله مراتبی است و بر رابطه چهره زمین (لندرم) با قابلیت ها و محدودیت های اراضی تأکید دارد(رامشت، ۱۳۸۴: ۱۵۴). مراحل و فرآیند کار به

شرح زیر است:

یا عوامل در برگیرنده آن با این تکنیک ها ارایه می گردد(رامشت، ۱۳۷۵: ۱۷۰).

کار تحلیل سیستم های ارضی با ورود رایانه در پردازش داده ها و اطلاعات با نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، تحول چشم گیری پیدا کرده و قدرت استخراج بسیاری از مطالب و همچنین طبقه بندی آنها، آن هم با سرعت بالا- که قبله "امکان پذیر نبوده- فراهم شده است. این سیستم ها امکاناتی فراهم می آورند که در بسیاری از موارد بینان تحلیل های فردی را تغییر داده، تفاسیر جدید و جامعتری را از محدودیت ها و مطلوبیت های محیطی بر ما روشن می سازند.

تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه

از اهداف مهم این تحقیق، تهیه نقشه کاربری اراضی یا پوشش سطحی زمین درمنطقه بوده است. شیوه استفاده از زمین به عنوان اطلاع پایه برای برنامه ریزی های مختلف، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقشه هایی که نمایشگر چنین فعالیت هایی هستند، نقشه کاربری اراضی نام دارند. نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه از طریق تصاویر ماهواره ای و مشاهده ها و نمونه برداری میدانی تهیه شده است.

ویژگی خاص تصاویر ماهواره ای، از جمله پوشش وسیع امکان تولید با مقیاس های مختلف، امکان استفاده از طول موج های متفاوت(باندهای طیفی) برای تولید تصاویر با طیف های گوناگون و مناسب با

توپوگرافی European 1950 است، برای تطبیق با تصویر ماهواره ای به WGS 84 تبدیل شده است؛

- ترکیب تصاویر ماهواره ای با باند پانکروماتیک آن؛

- طبقه بندی تصاویر به روش های نظارت شده و نظارت نشده؛

- اجرای روش های طبقه بندی(Mahalanobis distance – Maximum likelihood-minimum distance- parallel piped)

- انتخاب روش حداکثر احتمال با توجه به دقت بیشتر این روش در منطقه مورد مطالعه و ارزیابی دقت با نقطه های کنترل زمینی و نقشه های موجود؛

- استخراج نقشه کاربری اراضی؛

- تهیه نقشه های شب و جهت

- ارتفاع(هیپسومتری) در محیط GIS؛

- همپوشانی نقشه کاربری اراضی با نقشه های هیپسومتری و شب؛

- تهیه نقشه و جدول سیستم های اراضی منطقه.


بحث و نتایج

تحلیل سیستم های ارضی، مبتنی بر تقسیمات واحد های کوچک و بزرگی است که چهره زمین را به می سازند، یافته هایی که بدین ترتیب از ارزیابی ها به دست می آید، معمولاً" با نقشه و گراف، عکس و طرح، نمود شده و توزیع و ویژگی سیستم های اراضی

موجود شناسایی و تفکیک شود، تا هماهنگی مورد انتظار در نقشه مورد نظر برقرار گردد. روش‌های مختلفی برای شناسایی پدیده‌های مختلف زمینی از طریق تصاویر ماهواره‌ای و قرار دادن آنها در گروه‌های همگن وجود دارد. در این تحقیق، از روش طبقه‌بندی نظارت شده استفاده شده است. این روش با استفاده از نمونه‌های برداشت شده زمینی توسط GPS انجام گرفته است. این نقاط به عنوان نمونه‌هایی که کلاس آنها شناخته شده است، رابطه بین اطلاعات طیفی و زمینی را تعریف می‌کند.

هر مطالعه و سرانجام تکراری بودن آنها موجب گردیده که امروزه این گونه تصاویر در اجرای پژوهش‌ها و تهیه نقشه‌های مختلف به طور گسترده‌ای استفاده شوند و نقشه‌های بهنگام و با دقت مطلوب تهیه گردد (زبیری و مجد، ۱۳۷۸: ۱۸۱).


از آنجا که هنگام تهیه نقشه‌های کاربری اراضی از تصاویر ماهواره‌ای، سطوح مختلف زمین که با رنگ‌های مختلف بر روی تصاویر ظاهر می‌شوند، با ترسیم مرزهای مشخص از یکدیگر تفکیک می‌گردند، لازم است هر واحد مطابق با تعاریف و استانداردهای



شکل ۲: کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه

جنگل تنک (زیرگروه f)، اراضی بایر (بستر شنی، زیرگروه g)، و منابع آب سطحی (دریا، زیرگروه h) تقسیم‌بندی گردید (شکل‌های ۲ و ۳)، که با تعریف و استاندارد پذیرفته شده برای تهیه نقشه کاربری اراضی درجه ۱ منطبق است (زبیری و مجد، ۱۳۷۸: ۱۸۶).

تاکنون تعاریف و استانداردهای متفاوتی برای واحد‌های مختلف کاربری اراضی بیان شده است. در این مطالعه، کاربری زمین به انواع اراضی انسان ساخت مسکونی تجاری (زیرگروه a)، زمین‌های زراعی (زیرگروه b)، باغ‌ها (زیرگروه c)، اراضی مرتعی یا چمنزار (زیرگروه d)، جنگل انبوه (زیرگروه e)،




شكل ۳: کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه

شکلی و فیزیوگرافی شاخص در منطقه، به تقسیم بندی منطقه به محدوده هایی که ویژگی های فیزیکی مشابه دارند، مبادرت شد؛ به شیوه ای که هر ناحیه به واسطه تجانس خاص از ناحیه دیگر متمایز می گردد.

تهیه نقشه و جدول سیستم های ارضی منطقه به دنبال تعیین حدود منطقه مطالعاتی بر روی نقشه توپوگرافی و انجام مطالعات جغرافیایی با توجه به اطلاعات اولیه بدست آمده در مورد ویژگی های

ترتیب گروه‌های (۰-۲۰۰B)، (۰-۴۰۰C)، (۲۰۰-۴۰۰D)، (G)، (۶۰۰-۸۰۰E)، (۶۰۰-۱۰۰F)، (۱۰۰-۱۲۰H)، (۱۲۰-۱۴۰I)، (۱۴۰-۱۶۰J) بالاتر از (۱۶۰) هستند (شکل ۴).

این عمل؛ یعنی تفکیک سیستم‌ها در منطقه مورد مطالعه بر اساس شاخص‌های ارتفاعی انجام شد؛ به طوری که طبقات ارتفاعی به ۱۰ گروه ۲۰۰ متری تقسیم بندی شد، گروه (۰-۲۶۰A)، و به همین



شکل ۴: سطوح ارتفاعی منطقه مورد مطالعه


ارضی آغاز می‌شود. در این مرحله، تفکیک واحدهای ارضی بر اساس طبقات شیب انجام شد. در این مطالعه

بعد از تفکیک سیستم‌های موجود در منطقه، کار بررسی و ارزیابی هر سیستم برای تجزیه به واحدهای


۱۰۰ درصد که در گروه ۷ قرار گرفته اند، هستند(شکل ۵).

اجزای واحدهای اراضی بر اساس گروه های کاربری اراضی در منطقه است که چنانکه قبله" اشاره شد شامل ۸ گروه از a تا h تقسیم بندی شده اند(شکل ۶ و جدول ۱).

۷ واحد اراضی یا زیرسیستم تعیین گردید که این طبقات، شامل: شیب های ۰-۵ درصد به عنوان واحد ۱ و ۱۰-۵ درصد به عنوان واحد ۲، ۱۰-۲۰ درصد واحد ۳، ۲۰-۳۰ درصد واحد ۴، ۳۰-۶۰ درصد واحد ۵، ۶۰-۱۰۰ درصد واحد ۶ و شیب های بیشتر از ۱۰۰ و جدول ۱).



شکل ۵: طبقات شیب منطقه مورد مطالعه



جدول ۱: مشخصات سیستم های اراضی منطقه مورد مطالعه

محدودیت ارضی	قابلیت ارضی	خصوصیات فیزیوگرافی و نوع کاربری	مساحت (هکتار)	اجزای واحد	واحد اراضی	سیستم اراضی	ردیف
نامناسب از نظر ایجاد جنگل، دارای زمین های ماسه ای و شور در کرانه ساحلی، زهکشی نامناسب	مستعد برای کشاورزی با غداری و شهرسازی، فعالیت های انسانی (صنعتی و توریسم)	دارای ارتفاع ۲۶۰- با شب ۰-۵ درصد و کاربری مسکونی، زراعی، باغ و دریا	۱۳۶/۸۳	A _{1a}	A ₁	A	1
			۵۰۹/۲۷	A _{1b}			
			۷۹/۳۷	A _{1c}			
			۵۸۴/۶۶	A _{1h}			
بافت نسبتاً ریز خاک	مستعد برای کشاورزی با غداری و شهرسازی	ارتفاع ۲۶۰- متر و شب ۱۰-۵ درصد، کاربری زراعی	۳/۴۴۰	A _{2b}	A ₂		
بالا بودن سطح آب زیرزمینی، سیل گیر بودن	دارای جنگل های انبوه مستعد تولید الوار، دارای خاک عمیق با بافت متوسط تا سنگین، آبرفت رودخانه ای، مستعد برای با غداری و کشت های آبی یک ساله (برنج)	دارای ارتفاع ۲۰۰- با شب ۰-۵ درصد، کاربری های مسکونی، زراعی، باغ چمنزار (مرتع)، جنگل انبوه و بسترهاش شنی	۴۱۱/۶۷	B _{1a}	B ₁	B	2
			۱۴۹۶/۹۴	B _{1b}			
			۵۱۲/۰۳	B _{1c}			
			۳/۵۰	B _{1d}			
			۳۴/۶۴	B _{1e}			
			۰/۲۶	B _{1f}			
			۴/۴۸	B _{1g}			
			۳۸/۶۴	B _{2a}			
بالا بودن سطح آب زیرزمینی، سیل گیر بودن	دارای جنگل های انبوه مستعد تولید الوار، دارای خاک عمیق با بافت متوسط تا سنگین، آبرفت رودخانه ای، مستعد برای با غداری و کشت های دیم و آبی	ارتفاع ۲۰۰- با شب ۵-۱۰ درصد و کاربری های مسکونی، زراعی، باغ چمنزار (مرتع)، جنگل انبوه و بسترهاش شنی	۱۲۶/۶۵	B _{2b}	B ₂	B	2
			۶۰/۲۱	B _{2c}			
			۰/۹۷	B _{2d}			
			۱۴/۰۹	B _{2e}			
			۳/۹۴	B _{2g}			
			۲۰/۸۴	B _{3a}	B ₃	B	2
			۹۰/۱۷	B _{3b}			
			۹۲/۳۸	B _{3c}			
شیب نامناسب جهت کشاورزی، بالا بودن سطح آب زیرزمینی، سیل گیر بودن	دارای جنگل انبوه، مستعد تولید الوار دارای مراتع غنی و مناسب جهت با غداری	ارتفاع ۲۰۰- با شب ۱۰-۲۰ درصد و کاربری مسکونی، زراعی، باغ چمنزار (مرتع)، جنگل انبوه و بسترهاش شنی	۶۴/۲۱	B _{3e}			
			۲/۶۴	B _{3f}			
			۴/۲۶	B _{3g}			
			۹۰/۳۱	B _{3d}			
			۸/۲۹	B _{4a}	B ₄	B	2
			۹۸/۳۳	B _{4b}			
			۷۹/۳۶	B _{4c}			
			۱۱۸/۴۹	B _{4e}			
شیب نسبتاً زیاد، نامناسب جهت کشاورزی	مناسب جهت با غداری، جنگلداری و مرتع و خاک	ارتفاع ۲۰۰- با شب ۲۰-۳۰ درصد و کاربری مسکونی، زراعی، باغ چمنزار (مرتع)، جنگل انبوه و بسترهاش شنی	۱۳/۸۹	B _{4d}			
			۱۳/۷۵	B _{4f}			
			۱/۷۴	B _{4g}			

سیستم ارضی	نوبت	واحد ارضی	واحد	اجزای واحد	مساحت (هکتار)	خصوصیات فیزیوگرافی و نوع کاربری	قابلیت ارضی	محدودیت ارضی
B	2	B ₅	B _{5a}	۱/۸۴	دارای جنگل های انبوه	ارتفاع ۰-۲۰۰ با شیب ۳۰-۶۰ درصد و کاربری مسکونی، زراعی، باغ چمنزار(مرتع)، دارای خاک تکامل یافته	شیب تند، نامناسب جهت کشاورزی و مسکونی	
				۷۳/۷۷				
				۵۰/۹۸				
				۹/۲۸				
				۱۸۲/۶۹				
				۱۰/۴۳				
B ₆	2	B _{6b}	B _{6d}	۲/۸۹	دارای جنگل های انبوه مستعد تولید والار	ارتفاع ۰-۲۰۰ با شیب ۶۰-۱۰۰ درصد و کاربری زراعی، چمنزار(مرتع)، جنگل انبوه	شیب تند پرتوگاهی	
				۱/۴۳				
				۷۰/۰۲				
B ₇	2	B _{7e}		۱/۲۸	دارای جنگل های انبوه مستعد تولید والار	ارتفاع ۰-۲۰۰ متر و شیب بالاتر از ۱۰۰، کاربری جنگل انبوه	شیب تند پرتوگاهی	
C ₁	3	C _{1b}	C _{1e}	۰/۲۳	دارای ارتفاع ۴۰۰-۲۰۰ متر با شیب ۵-۰ درصد، کاربری جنگل انبوه و زراعی	دارای جنگل انبوه، با غداری، و مناسب زراعت دیم	تشدید فرسایش آبی	
				۹/۵۴				
C ₂	3	C _{2b}	C _{2c}	۱/۰۵	دارای ارتفاع ۴۰۰-۲۰۰ متر با شیب ۱۰-۵ درصد، کاربری های باغ، جنگل انبوه و زراعی	جنگل انبوه، و مناسب	فرسايش سطحی و شیاری و حرکت دامنه ای در مناطق زراعی	
				۰/۶۲				
				۱۵/۰۴				
C ₃	3	C _{3a}	C _{3e}	۲/۱۶	دارای ارتفاع ۴۰۰-۲۰۰ متر با شیب ۱۰-۲۰ درصد، کاربری های مسکونی، باغ، جنگل انبوه و زراعی	مناسب جهت با غداری، دارای خاک مناسب، پوشش گیاهی غنی	از نظر کشاورزی به جهت شیب نسبتاً تند، تشدید حرکات دامنه ای	
				۲۰/۴۰				
				۱۵/۴۳				
				۱۲۸/۰۹				
C ₄	3	C _{4a}	C _{4f}	۱/۶۰	دارای ارتفاع ۴۰۰-۲۰۰ متر با شیب ۲۰-۳۰ درصد، کاربری های مسکونی، باغ، جنگل انبوه و تنک و زراعی	جنگل انبوه، تنوع گونه های گیاهی و جانوری	شیب تند، تشدید فرسايش آبی و تحولات دامنه ای	
				۵۰/۶۰				
				۳۱/۸۰				
				۳۲۶/۳۵				
				۳/۹۷				
C ₅	3	C _{5a}	C _{5f}	۱/۸۴	دارای ارتفاع ۴۰۰-۲۰۰ متر با شیب ۳۰-۶۰ درصد، کاربری های مسکونی، باغ، جنگل انبوه و تنک و زراعی	پوشش گیاهی متراکم جنگلی	شیب تند برای کشاورزی و تشدید فسایش آبی و فرایندهای دامنه ای	
				۵۷/۲۹				
				۱۹/۹۷				
				۷۹۴/۶۵				
				۱۲/۹۱				
C ₇	4	C _{7e}		۱/۸۷	دارای ارتفاع ۴۰۰-۲۰۰ متر و شیب بیشتر از ۱۰۰ و کاربری جنگل انبوه	جنگل انبوه و مستعد تولید	شیب تند و پرتوگاه سنگی	
D ₁	4	D _{1e}	D ₁	۲/۳۸	دارای ارتفاع ۶۰۰-۴۰۰ و با شیب -۵ درصد، کاربری جنگل انبوه	جنگل انبوه و تکامل پرفلی خاک	نامناسب برای فعالیت های انسانی	
D ₂	4	D _{2e}	D ₂	۸/۲۴	دارای ارتفاع ۶۰۰-۴۰۰ و با شیب -۱۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	جنگل انبوه و خاک تکامل یافته	نامناسب برای فعالیت های انسانی	
D ₃	4	D _{3e}	D ₃	۱۷۵/۵۲	دارای ارتفاع ۶۰۰-۴۰۰ و با شیب -۲۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	جنگل انبوه مستعد تولید والار	شیب نسبتاً تند	

محدودیت ارضی	قابلیت ارضی	خصوصیات فیزیوگرافی و نوع کاربری	مساحت (هکتار)	اجزای واحد	واحد ارضی	سیستم ارضی	جهت		
شیب تند و محدودیت برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه مستعد تولید الوار	دارای ارتفاع ۴۰۰-۶۰۰ و با شیب -۳۰ درصد، کاربری مسکونی	۰/۴۲۲	D _{4a}	D ₄	D	4		
			۴۵۳/۷۰	D _{4e}					
شیب تند و تشذیبد فرایندهای فرسایشی	جنگل انبوه و پوشش گیاهی متراکم	دارای ارتفاع ۴۰۰-۶۰۰ و با شیب -۳۰ درصد، کاربری مسکونی، کشاورزی، جنگل انبوه و تنک	۱/۴۶	D _{5a}	D ₅				
			۱/۰۷	D _{5b}					
			۱۰۱۲/۰۶	D _{5e}					
			۱/۱۷۷	D _{5f}					
شیب تند و پرتگاه سنگی	جنگل انبوه و پوشش گیاهی متراکم	دارای ارتفاع ۴۰۰-۶۰۰ و با شیب -۱۰۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۷۷/۰۵	D _{6e}	D ₆				
شیب تند پرتگاهی	جنگل انبوه و پوشش گیاهی متراکم	دارای ارتفاع ۴۰۰-۶۰۰ و با شیب بیشتر از ۱۰۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۴/۳۶	D _{7e}	D ₇				
نامناسب برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه و تکامل پرفیلی خاک	دارای ارتفاع ۶۰۰-۸۰۰ و با شیب -۵ درصد، کاربری جنگل انبوه	۳/۴۴	E _{1e}	E ₁	E	5		
نامناسب برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه و تکامل پرفیلی خاک	دارای ارتفاع ۶۰۰-۸۰۰ و با شیب -۱۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۶/۰۷	E _{2e}	E ₂				
شیب تند و محدودیت برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه و تکامل پرفیلی خاک	دارای ارتفاع ۶۰۰-۸۰۰ و با شیب -۲۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۱۲۵/۵۴	E _{3e}	E ₃				
شیب تند	جنگل انبوه مستعد تولید الوار	دارای ارتفاع ۶۰۰-۸۰۰ و با شیب -۳۰ درصد، کاربری جنگل انبوه و مسکونی	۵/۲۰	E _{4a}	E ₄				
			۴۹۲/۳۳	E _{4e}					
شیب تند و محدودیت برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه مستعد تولید الوار	دارای ارتفاع ۶۰۰-۸۰۰ و با شیب -۶۰ درصد، کاربری جنگل انبوه و مسکونی	۳۷/۶۱	E _{5a}	E ₅				
			۷۲۷/۲۲	E _{5e}					
شیب تند و محدودیت برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه مستعد تولید الوار	دارای ارتفاع ۶۰۰-۸۰۰ و با شیب -۶۰ درصد، کاربری جنگل انبوه و مسکونی	۳/۲۸	E _{6a}	E ₆				
			۲۲/۰۴	E _{6e}					
نامناسب برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه و تکامل پرفیلی خاک	دارای ارتفاع ۸۰۰-۱۰۰۰ و با شیب -۵ درصد، کاربری جنگل انبوه	۰/۸۱	F _{1e}	F ₁	F	6		
نامناسب برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه و تکامل پرفیلی خاک	دارای ارتفاع ۸۰۰-۱۰۰۰ و با شیب -۱۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۴/۷۱	F _{2e}	F ₂				
نامناسب برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه و پوشش گیاهی متراکم	دارای ارتفاع ۸۰۰-۱۰۰۰ و با شیب -۲۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۹۴/۷۴	F _{3e}	F ₃				
شیب نسبتاً تند و نامناسب برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه و پوشش گیاهی متراکم	دارای ارتفاع ۸۰۰-۱۰۰۰ و با شیب -۲۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۳۲۰/۲۳	F _{4e}	F ₄				
شیب تند و نامناسب برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه و پوشش گیاهی متراکم	دارای ارتفاع ۸۰۰-۱۰۰۰ و با شیب -۶۰ درصد، کاربری جنگل انبوه و مسکونی	۱۱/۹۵۶	F _{5a}	F ₅				
			۴۵۰/۱۳	F _{5e}					

محدودیت ارضی	قابلیت ارضی	خصوصیات فیزیوگرافی و نوع کاربری	مساحت هکتار)	اجزای واحد	واحد ارضی	سیستم ارضی	نمره
شیب تند و نامناسب برای فعالیت‌های دارای پرتوگاه های سنگی	جنگل انبوه مستعد تولید الوار	دارای ارتفاع ۱۰۰۰-۸۰۰ و با شیب ۶ درصد، کاربری جنگل انبوه و مسکونی	۰/۲۲۵	F _{6a}	F ₆	F	6
نامناسب برای فعالیت-های انسانی	جنگل انبوه و تکامل پروفیلی خاک	دارای ارتفاع ۱۲۰۰-۱۰۰۰ و با شیب ۵-۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۲۰/۳۷	F _{6e}	G _{1e}	G ₁	
نامناسب برای فعالیت-های انسانی	جنگل انبوه و تکامل پروفیلی خاک	دارای ارتفاع ۱۲۰۰-۱۰۰۰ و با شیب ۱۰-۵ درصد، کاربری جنگل انبوه	۲/۱۷	G _{2e}	G ₂		
نامناسب برای فعالیت-های انسانی	جنگل انبوه و تکامل پروفیلی خاک	دارای ارتفاع ۱۲۰۰-۱۰۰۰ و با شیب ۲۰-۲۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۴۸/۱۱	G _{3e}	G ₃		
شیب نسبتاً تند و نامناسب برای فعالیت-های انسانی	جنگل انبوه و تکامل پروفیلی خاک	دارای ارتفاع ۱۲۰۰-۱۰۰۰ و با شیب ۳۰-۲۰ درصد، کاربری جنگل انبوه و مسکونی	۰/۸۵	G _{4a}	G _{4e}	G ₄	7
شیب تند و نامناسب برای فعالیت‌های انسانی	جنگل انبوه و تکامل پروفیلی خاک	دارای ارتفاع ۱۲۰۰-۱۰۰۰ و با شیب ۴۰-۳۰ درصد، کاربری جنگل انبوه و مسکونی	۲۲۵/۱۹	G _{5a}	G _{5e}	G ₅	
شیب تند و نامناسب برای فعالیت‌های انسانی	جنگل انبوه	دارای ارتفاع ۱۲۰۰-۱۰۰۰ و با شیب ۶۰-۵۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۶۵/۲۷	G _{6e}	G ₆		
شیب تند و نامناسب برای فعالیت‌های انسانی	جنگل انبوه	دارای ارتفاع ۱۲۰۰-۱۰۰۰ و با شیب بیشتر از ۱۰۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۱۰/۷۳	G _{7e}	G ₇		
محدودیت فعالیت‌های انسانی و فرسایش آبی	جنگل انبوه، دارای شیب مناسب جهت کشاورزی	دارای ارتفاع ۱۴۰۰-۱۲۰۰ و با شیب ۵-۰ درصد، کاربری جنگل انبوه و زراعی	۱۲/۲۴	H _{1b}	H _{1e}	H ₁	
محدودیت فعالیت‌های انسانی و فرسایش آبی	جنگل انبوه، دارای شیب مناسب جهت کشاورزی	دارای ارتفاع ۱۴۰۰-۱۲۰۰ و با شیب ۱۰-۵ درصد، کاربری جنگل انبوه و زراعی	۱۲/۹۳	H _{2b}	H _{2e}	H ₂	
تشدید فرایند های فرسایش آبی و دامنه ای	پوشش گیاهی متراکم	دارای ارتفاع ۱۴۰۰-۱۲۰۰ و با شیب ۲۰-۲۰ درصد، کاربری جنگل انبوه، مسکونی و زراعی	۱/۰۶	H _{3a}	H _{3b}	H _{3e}	8
شیب نسبتاً تند فرسایش سطحی و شیاری و حرکت دانه ای	پوشش گیاهی متراکم	دارای ارتفاع ۱۴۰۰-۱۲۰۰ و با شیب ۳۰-۲۰ درصد، کاربری جنگل انبوه و مسکونی، زراعی و تک	۹۶/۳۷	H _{4a}	H _{4b}	H _{4e}	
تشدید فرایند های فرسایش آبی و دامنه ای	پوشش گیاهی متراکم	دارای ارتفاع ۱۴۰۰-۱۲۰۰ و با شیب ۴۰-۳۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۷۶/۷۶	H _{4e}	H _{4f}		
			۴/۴۴				
			۱۷۴/۴۷				
			۲۵۲/۸۵				
			۰/۲۳				
			۵/۲۲۶				

سیستم اراضی	نوع	واحد اراضی	جزئی	سیستم اراضی	نوع	واحد اراضی	جزئی	محدودیت اراضی	قابلیت اراضی	خصوصیات فیزیوگرافی و نوع کاربری	مساحت (هکتار)
H	8	H _{6e}	H ₆	I _{1a}	ارتفاع ۱۴۰۰-۱۲۰۰ متر و شیب ۵-۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۱۰۲/۲۷	J _{6e}	شیب تند و نامناسب برای فعالیت های انسانی	جنگل انبوه مستعد تولید الوار	دارای ارتفاع ۱۴۰۰-۱۲۰۰ متر و با شیب بیشتر از ۱۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۰/۲۶
I ₁	I ₃	H _{7e}	H ₇	I _{1b}	ارتفاع ۱۴۰۰-۱۲۰۰ متر و با شیب ۵-۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۱۷/۶۵۷	J _{7e}	شیب تند و نامناسب برای فعالیت های انسانی و دارای پر تگاه های سنگی	جنگل انبوه مستعد تولید الوار	دارای ارتفاع ۱۴۰۰-۱۲۰۰ متر و با شیب بیشتر از ۱۰ درصد، کاربری جنگل انبوه	۲۸/۴۳
I ₁	I ₂	I _{1e}		I _{2b}	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵ درصد، کاربری زراعی	۱۴/۳۱	I _{2b}	فرسایش شیاری و صفحه ای	جنگل انبوه، مناسب جهت کشاورزی و مسکونی (روستایی)	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵ درصد و کاربری مسکونی، کشاورزی و جنگل انبوه	۰/۲۶
I ₃	I ₄	I _{3a}	I _{4a}	I _{3b}	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵ درصد، کاربری مسکونی، زراعی، جنگل انبوه و تنک	۴/۸۱۷	I _{4a}	فرسایش شیاری و صفحه ای	زنگل انبوه، زراعت دیم و آبی	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵ درصد، کاربری زراعی	۴/۸۱۷
I ₃	I ₄	I _{3b}	I _{4b}	I _{4c}	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵ درصد، کاربری مسکونی، زراعی، جنگل انبوه و تنک	۴/۶۰/۱۸	I _{4c}	شیب نسبتاً تند، تشدید فرایند های فرسایش آبی و دامنه ای	جنگل انبوه، دارای شیب مناسب برای کشاورزی	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵ درصد، کاربری مسکونی، زراعی، باخی، جنگل انبوه و تنک	۴/۶۰/۱۸
I ₃	I ₄	I _{3e}	I _{4d}	I _{4e}	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵ درصد، کاربری مسکونی، زراعی، جنگل انبوه و تنک	۲۶۲/۸۵	I _{4f}	شیب تند، تشدید فرایند های فرسایش آبی و دامنه ای	جنگل انبوه و مستعد تولید الوار	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵ درصد، کاربری مسکونی، زراعی، جنگل انبوه و تنک	۱۳/۴۷
I ₅	I ₆	I _{5a}	I _{6e}	I ₆	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵ درصد، کاربری جنگل انبوه	۱۱۴/۱۸	I _{5b}	شیب تند و نامناسب برای فعالیت های انسانی و دارای پر تگاه های سنگی	جنگل انبوه	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵ درصد، کاربری جنگل انبوه	۱۰/۸۵
I ₇	I ₆	I _{5b}	I _{6e}	I ₆	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب بیشتر از ۱۰ درصد، کاربری مسکونی، جنگل انبوه	۵۶۳/۴۸	I _{5c}	شیب تند و نامناسب برای فعالیت های انسانی و دارای پر تگاه های سنگی	جنگل انبوه	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب بیشتر از ۱۰ درصد، کاربری مسکونی، جنگل انبوه	۱۱۴/۱۸
I ₇	J ₂	I _{7a}	J _{2b}	J ₂	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵-۱۰ درصد و کاربری زراعی	۳/۰۸	J _{3b}	فرسایش شیاری و صفحه ای	زراعت دیم و آبی	ارتفاع بالاتر از ۱۶۰۰ متر و شیب ۵-۱۰ درصد و کاربری زراعی	۰/۲۶
J ₃	J ₄	I _{7e}	J _{3b}	J ₃	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵-۲۰ درصد و کاربری زراعی و جنگل انبوه	۰/۴۱	J _{4e}	فرسایش شیاری و صفحه ای و حرکات دامنه ای	زراعت دیم و آبی، جنگل انبوه	ارتفاع بالاتر از ۱۶۰۰ متر و شیب ۵-۲۰ درصد و کاربری زراعی و جنگل انبوه	۰/۵۱
J	J ₅	J _{4e}	J ₄	J ₄	ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵-۳۰ درصد و کاربری جنگل انبوه	۲/۱۳	J _{5e}	شیب تند پر تگاهی	جنگل انبوه و مستعد تولید الوار	ارتفاع بالاتر از ۱۶۰۰ متر و شیب ۵-۳۰ درصد و کاربری جنگل انبوه	۰/۶۱
J	J ₅	J _{5e}	J ₅		ارتفاع ۱۶۰۰-۱۴۰۰ متر و شیب ۵-۴۰ درصد و کاربری جنگل انبوه	۰/۶۱		شیب تند و پر تگاه های سنگی	جنگل انبوه و متراکم	ارتفاع بالاتر از ۱۶۰۰ متر و شیب ۵-۴۰ درصد و کاربری جنگل انبوه	۰/۶۱

نتیجه گیری

توپوگرافی قرار گرفته است. البته نگارندگان در این زمینه استانداردی را پیدا نکرده و تنها بر اساس درجه پایداری نسبی شیب‌ها اظهارنظر کرده‌اند. جهت شیب غالب شمالی است و بعد از آن به ترتیب شمال غربی و شمال شرقی بیشترین وسعت را در منطقه به خود اختصاص داده‌اند.

ارتفاعات ۴۰۰ تا ۱۶۵۰ متر به طور کلی $8393/5$ هکتار مساحت منطقه را دربر گرفته است. از این میزان، 6180 هکتار معادل $73/6$ از این بخش را جنگل انبوه و $17/2$ درصد از منطقه ($1447/70$ هکتار) زیر کشت رفته که این عمل با تخریب درختان جنگلی همراه بوده است. از این مقدار $1239/7$ هکتار (درصد) در شیب‌های بالاتر از 10 درصد قرار دارد که زراعت در آن باعث تخریب و فرسایش شدید خاک این اراضی گشته است.

در ارتفاعات بین $200-400$ متری که سطحی برابر $1583/3$ هکتار را اشغال کرده است، 1380 هکتار برابر 87 درصد را جنگل انبوه و تنک، 130 هکتار برابر $8/2$ درصد اراضی زراعی، که از این 98 هکتار در شیب‌های تندر و خطرساز قرار گرفته‌اند.

واحد توپوگرافی جلگه ای $9626/28$ هکتار وسعت دارد. این واحد $49/5$ درصد از کل محدوده مورد بررسی را تشکیل داده است. اکثر روستاهای پرجمعیت و نیز شهر گلوگاه و سایر فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی در این واحد انجام می‌شود. درصد این واحد توپوگرافی، مسکونی و $25/7$ درصد

منطقه مورد مطالعه به طور مشخص به سه واحد جلگه، تپه ماهور پایکوهی و کوهستان قابل تقسیم است. وسعت کل منطقه مورد مطالعه 19603 هکتار بوده، کاربری جنگل انبوه با وسعت $8477/16$ هکتار 45 درصد از منطقه را در بر گرفته است و از کل مناطق جنگلی $5/7$ درصد در ارتفاع $200-200$ متر و بقیه ($94/3$ درصد) در ارتفاعات بیش از 200 متر به صورت یکنواخت قرار گرفته‌اند.

بعد از کاربری جنگل انبوه، کاربری زراعی دومین رتبه را از نظر وسعت در منطقه به خود اختصاص داده است که مساحتی برابر $8477/1$ هکتار، معادل 43 درصد از وسعت منطقه مورد مطالعه است. 79 درصد از مناطق زراعی در ارتفاع $26-200$ متر با شیب $10-0$ درصد؛ یعنی در واحد جلگه قرار دارد و 21 درصد در شیب‌های بین $100-100$ درصد قرار گرفته است. ناحیه مسکونی با وسعت $729/2$ هکتار، برابر $3/7$ درصد از منطقه مورد مطالعه را در بر می‌گیرد که شامل یک نقطه شهری و 26 نقطه روستایی در واحدهای مختلف توپوگرافی است. $136/8$ هکتار در ارتفاع $26-0-260$ متر و $481/3$ هکتار در ارتفاع $0-200$ قرار دارد که به ترتیب $18/7$ و 66 درصد از ناحیه مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد. حدود 90 درصد ناحیه مسکونی در شیب $0-10$ درصد قرار دارند و تنها 10 درصد از آن در شیب $30-100$ درصد واقع شده است بنابراین، می‌توان گفت در منطقه مورد مطالعه کاربری‌های مختلف متناسب با

- ۴- رامشت، محمد حسین. (۱۳۷۵). کاربرد زیومرفولوژی در برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان.
- ۵- (۱۳۸۴). نقشه های زیومرفولوژی (نمادها و مجازها)، تهران: انتشارات سمت.
- ۶- رهنمايي، محمد تقى. (۱۳۷۵). توان های محيطی ايران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
- ۷- زيرى، محمود و مجد، عليرضا. (۱۳۷۸). آشنایي با فن سنجش از دور با کاربرد در منابع طبيعى، دانشگاه تهران.
- ۸- زنگنه اسدی، محمد علی. (۱۳۷۱). «نقش استفاده از زمين و اهميت آن در عمران مناطق»، مجموعه مقالات هشتمين کنگره جغرافيدانان ايران ج ۱: طبيعى، انتشارات دانشگاه اصفهان، صص ۱۸۶-۱۹۳.
- ۹- سازمان جهادکشاورزی. (۱۳۸۰). نقشه های کاربری اراضی استان مازندران.
- ۱۰- سازمان زمین شناسی واکنشافات معدنی کشور. (۱۳۷۹). نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ بهشهر.
- ۱۱- سازمان نقشه برداری کشور. (۱۳۸۲). نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ گلوگاه.
- ۱۲- سازمان نقشه برداری کشور. (۱۳۸۲). نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ بندرگز.
- ۱۳- سدیدى، جود. (۱۳۸۴). بارزسازی تغييرات با استفاده از تصاویر راداری و ماهواره اى RADARSAT منطقه مورد مطالعه اطراف خلیج گرگان، پيان نامه کارشناسى ارشد سنجش از دور، دانشگاه تربیت مدرس.

زير کشت محصولات کشاورزی ديم و آبى، ۹ درصد باغ ها و ۱۰ درصد را نيز جنگل های انبوه و نيمه انبوه تشکيل مى دهد. ۶ درصد از مساحت مزبور را نيز دريای خزر اشغال كرده است.

با توجه به وضعیت منطقه از نظر تغييرات ارتفاعی از ۲۶-تا ۱۶۵۰ متر و با وجود رودخانه های اصلی و شاخه های فرعی آنها، خطر سیل در واحد جلگه اى که بيشترین زمين های زراعی ديم و آبى در آنجا قرار دارد، احساس مى شود. از سوی ديگر، نياز به زمين های زراعی بيشتر باعث شده است در برخی بخش های پرشيب، با تخریب جنگل و انجام فعالیت کشاورزی ميزان فرسایش شيارى و سطحی افزایش يافته، فرسایش خاک سريعتر انجام شود.

منابع

- ۱- باقرى، عباس. (۱۳۷۶). توان سنجي اقتصادي اجتماعي با تأكيد بر کشاورزی مورد ناحيه گلوگاه، پيان نامه کارشناسى ارشد جغرافياي انساني، دانشگاه شهيد بهشتى.
- ۲- جهانى، علی. (۱۳۷۶). بارزسازی تغييرات کاربری های منطقه مهر آباد تهران از طريق PCA و اطلاعات ماهواره اى اسپات، مرکز اطلاعات جغرافياي شهر تهران.
- ۳- دنگرى، ج. (۱۳۷۶). راهنمای تهيه نقشه های موضوعي از تصاویر ماهواره اى، ترجمه حميد مالميريان، سازمان جغرافيايي نiroهای مسلح.

- ۱۴- مخدوم، مجید. (۱۳۸۰). *شالوده آمایش سرزمین*، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
- ۱۵- مقیمی، ابراهیم و محمودی، فرج ... (۱۳۸۳). *روش تحقیق در جغرافیای طبیعی (ژیومورفولوژی)* تهران: نشر قومس.
- ۱۶- ملک، جواد و ستایی جویباری، شعبان. (۱۳۸۴). «بررسی تغییرات سیمای طبیعی و کاربری اراضی سواحل جنوبی دریای خزر»، با استفاده از عکس‌های هوایی و GIS، مطالعه موردی سواحل شهرستان نور، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، ش. ۵۱.
- ۱۷- مسعودی، مسعود. (۱۳۷۷). بررسی کاربری اراضی با استفاده از داده‌های رقومی و ماهواره‌ای و GIS در منطقه موک فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران.
- ۱۸- مهندسین مشاور جامع ایران. (۱۳۸۴). طرح تفضیلی مطالعه حوزه گلوگاه.
- ۱۹- یوسف زاده چورسی، اردشیر. (۱۳۸۰). بررسی تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن بر فرسایش خندقی در منطقه دشتیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی.
- 20- Jensen, John, R. (2000). *Remote sensing of the environment an earth resource perspective*, Prentice Hall.